

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.
- Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur, prévenir l'équipe médicale.

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséeux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

Protocole VECTIBIX

Vous allez suivre un traitement par un anticorps ciblé VECTIBIX® (Panitumumab)

Vectibix® est administré par voie intraveineuse sur 1h30 à raison d'une fois toutes les 2 semaines



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.

Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.

Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **VECTIBIX**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réactions cutanées : acné, rash, érythème, prurit, sécheresse cutanée. • Stomatite, aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres. • Syndrome main-pied : sécheresse de la peau et rougeur des mains et des pieds. Douleur dans les mains et les pieds. • Douleurs abdominales, diarrhées. • Altération des ongles (infection du lit de l'ongle, décollement). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se protéger du soleil : ne pas s'exposer et utiliser un écran total. Un traitement préventif associant soins locaux et antibiotiques est généralement prescrit. • Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac. • Eviter toute exposition des mains et des pieds à la chaleur, et toute compression des extrémités (gants, chaussures trop serrées...). Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum. • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. • Se couper les ongles courts afin d'éviter qu'ils ne se fissurent ou se soulèvent. Consulter un podologue pour des soins préventifs. 	<ul style="list-style-type: none"> • En parler à votre médecin. L'acné est réversible à l'arrêt du traitement. • Prévenir le médecin qui pourra vous prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale. • En parler au médecin ou à l'infirmière. • Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48h, prévenir le médecin. • Prévenir le médecin en cas d'infection.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nausées, vomissements. • Réactions allergiques liée à la perfusion : fièvre, frissons, démangeaisons, sensation de malaise, rougeurs, inconfort thoracique, douleurs dorsales. • Affections oculaires : larmoiements, conjonctivite, démangeaisons, infection de la paupière, sécheresse oculaire. • Tachycardie : pulsations cardiaques accélérées ou irrégulières, essoufflement. • Dyspnée (difficultés respiratoires), toux. • Sécheresse buccale, sécheresse nasale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas. • Boire suffisamment. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si les vomissements ont lieu moins d'une heure après la prise des comprimés (sauf lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Prévenir rapidement le médecin ou l'infirmière. • En parler au médecin qui pourra vous prescrire un collyre. • Prévenir rapidement le médecin. • Prévenir rapidement le médecin. • En parler au médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.