




CONTRIBUTION DU GROUPE PHARMACIEN DU RESEAU ONCAUVERGNE A L'INFORMATION DES ACTEURS DU RESEAU

Régine CHEVRIER Nancy 21-09-06

Réseau Oncauvergne: Groupe Pharmacien

- Création du groupe en 2002
- Prise en compte du contexte pharmaceutique au sein du réseau
- 10 PH- 7 villes- Etablissements publics et privés

Réseau Oncauvergne: Groupe Pharmacien



Réseau Oncauvergne: groupe pharmacien

■ Objectifs et missions:

- ◆ Pour les professionnels et les structures
 - Harmonisation des pratiques de préparation des chimiothérapies
 - Echange d'informations
 - Formation continue

Réseau Oncauvergne: groupe pharmacien

■ Objectifs et missions:

◆ Pour les patients:

- Homogénéisation des pratiques
- Elaboration de supports écrits d'information



Réseau Oncauvergne: groupe pharmacien

■ Objectifs et missions:

◆ Pour la santé publique:

- Sources de données régionales (enquêtes)



Contribution à l'information

■ Pour les professionnels:

◆ Harmonisation des pratiques:

◆ Elaboration de référentiels

- Préparation des agents anticancéreux dans une unité centralisée
- Modalités de reconstitution dilution des spécialités anticancéreuses – Données de stabilités
- Disponibilité sur site www.oncauvergne.com

VINBLASTINE (VLB)



SPECIALITES : VELBE
LABORATOIRE : EG LABO
PRESENTATION : 10 mg. Lyophilisat
conservaTION : + 4°C

	RECONSTITUTION	DILUTION
Volume	10 ml	Seringue 20 ml Poche 100 ml
Solvant	NaCl	G5 % ou NaCl
Concentration	1 mg/ml	0,003 à 0,5 mg/ml
Stabilité conservation	1 mois à + 4°C - AL	96 H à + 4°C ou à TA

DOSE MAXIMALE CUMULEE : 18,5 mg/m²/semaine (adulte)

REMARQUE : voie intrathécale interdite : risque mortel

MODE D'ADMINISTRATION :

- **Voie** : IV intratubulaire
- **Durée** :

Posologie : - IVD 4 à 7 mg/m² avec 18,5 mg/m²/semaine (adulte)

- perfusion continue 1,5 à 2 mg/m²/J pendant 5 jours

Contribution à l'information

■ Pour les professionnels:

◆ Formation et échanges d'informations:

- ◆ Pharmaciens d'officine: Journée d'information
 - 120 participants
 - Point sur le décret rétrocession du 15 juin 2004
 - Enquête sur la connaissance et les attentes vis à vis du réseau
 - Diffusion de fiches conseils patients

Les attentes vis à vis du réseau

Organe de communication entre professionnels de santé

- ▶ relation avec un pharmacien référent - avec prescripteurs
- ▶ information sur le dossier du patient, l'historique thérapeutique
- ▶ transmission des prescriptions - renseignements téléphoniques
- ▶ compréhension du traitement dans sa globalité
- ▶ coordination des soins - suivi du patient - anticipation / à ses besoins

Structure d'information et de formation

- ▶ information sur les médicaments et les thérapeutiques
- ▶ formation dans le domaine de la cancérologie

Structure d'organisation des soins

- ▶ préparation des chimiothérapies en pharmacie des C.H. référents
- ▶ organisation de l'acheminement des préparations injectables
- ▶ groupement d'achat des dispositifs médicaux nécessaires.

XELODA (Capécitabine) COMPRIMES

Votre médecin vous a prescrit un traitement essentiel pour votre maladie. Il se présente sous forme de comprimés et doit être pris par voie orale.

❖ COMMENT ET QUAND PRENDRE CE MEDICAMENT ?

Vous devez vous conformer à la posologie que votre médecin a indiquée sur l'ordonnance.

Le XELODA se prend deux fois par jour : le matin et le soir.

Avalez vos comprimés 30 minutes après le repas avec un verre d'eau.

Ne retirez le médicament de son emballage qu'au moment de la prise.

❖ QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI D'UNE PRISE ?

Si vous oubliez une prise, ne doublez pas la dose suivante. Poursuivez le traitement normalement.

❖ COMMENT CONSERVER VOTRE MEDICAMENT ?

Conservez les comprimés dans le conditionnement d'origine, à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la plaquette et la boîte.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Les comprimés ne doivent jamais être coupés.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Ne soyez pas inquiets à la lecture de la liste des effets indésirables, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Très fréquents :

☒ Des picotements, une sensation d'engourdissement, des gonflements et des rougeurs au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds.

☒ Des diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, une perte d'appétit

☒ Des plaies douloureuses dans la bouche.

☒ Une fatigue

Fréquents :

☒ Des maux de tête, des sensation de vertiges,

☒ De la fièvre.

ARRÊTEZ de prendre votre traitement IMMEDIATEMENT et consultez le médecin responsable de votre traitement, dès que possible si l'un des symptômes suivants apparaît :

- Une douleur, un œdème, une rougeur des mains et / ou des pieds.
- Une diarrhée sévère (si vous allez à la selle plus de 4 fois par jour ou si vous souffrez de diarrhée pendant la nuit).

❖ EXISTE T-IL DES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ?

Des interactions médicamenteuses sont possibles avec : certains anticoagulants oraux, antiépileptiques, l'acide folinique (FOLINORAL, LEDERFOLINE, OSFOLATE), les antiacides, l'allopurinol (ZYLORIC).

Dans tous les cas, ne prenez aucun autre médicament que le XELODA sans l'accord de votre médecin.

❖ QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS ?

Allergie au médicament, allergie au 5-FluoroUracile (5-FU).

❖ PRECAUTIONS PARTICULIERES :



Contribution à l'information

■ Pour les professionnels:

◆ Formation :

- ◆ Formation continue pour les préparateurs en pharmacie hospitalière: « Cancérologie: De la pathologie au médicament »

Contribution à l'information

■ Pour les patients:

◆ Elaboration de fiche information patient :

- ◆ Contribution dans le cadre du dispositif d'annonce
- ◆ Fiche d'information sur les effets secondaires des protocoles de chimiothérapie
- ◆ Evaluation dans 7 établissements auvergnats



FICHE INFORMATION PATIENT

Protocole FEC

Vous allez suivre un traitement selon le protocole FEC.
Ce protocole comprend l'administration de 3 médicaments

- 5 fluorouracile
- Epirubicine
- Cyclophosphamide

Cette cure sera répétée tous les 21 jours.
Ces médicaments seront administrés en perfusion intraveineuse.

La durée moyenne de la séance sera de 2 heures.



Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

■ Quels sont les effets secondaires éventuels?

◆ Fréquence

◆ Prévention

◆ Que faire?

Contribution à l'information

■ Pour la santé publique:

- ◆ Enquête sur le bon usage du médicament en cancérologie :
 - ◆ Réalisée sur 9 établissements
 - ◆ 1 semaine de recueil (septembre 2005)
 - ◆ 5 médicaments anticancéreux ciblés
 - ◆ Evaluation de la conformité à l'AMM pour les médicaments cibles


Contribution à l'information

■ Résultats :

- ◆ 353 prescriptions analysées
- ◆ 2 référentiels de cotation utilisés
 - Référentiel de la fédération des centres de lutte contre le cancer
 - Référentiel: fiches de bon usage.
Commission des pharmaciens de CHU

Contribution à l'information

Résultats de l'enquête



Rétrocession
Information patient

Chimiothérapie à domicile

Bonnes pratiques de
préparation des chimio
thérapies

Référentiel de pratiques
en chimiothérapie

Contrat de bon usage
des médicaments

Tarification à
L'activité

